




แนวทางการรักษาและสั่งต่อ (Clinical Practice Guideline)		
เรื่องที่ 1 : แนวทางการรักษาและสั่งต่อผู้ป่วย Acute Ischemic Stroke		
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการทึมนำ ทางคลินิก รพ.โคกศรีสุพรรณ	หน่วยงานที่ใช้ : รพสต.ในอำเภอโคกศรีสุพรรณ	ฉบับที่ 2 วันที่เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ตรวจสอบ  (นพ.ภาษิต พิพิชวณิชธรรม) นายแพทย์ปฏิบัติการ ประธานทึมนำทางคลินิก		ผู้อนุมัติ  (พญ.ณัฐปภัสร นวัตกรรมศิริกุล) นายแพทย์ชำนาญการ วิชาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ

บันทึกการประกาศใช้/ปรับปรุง

ฉบับที่	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียด	แก้ไขโดย	อนุมัติโดย
1	1 เม.ย.61	-	พญ.ณัฐปภัสร	ผู้อำนวยการรพ.
2	1 ก.พ.64	-	นพ.ภาษิต	ผู้อำนวยการรพ.



แนวทางการรักษาและส่งต่อผู้ป่วย Acute Ischemic Stroke สำหรับ รพสต.

ผู้ป่วยมาด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

1. F (FACE) : ปากเบี้ยว หนึ่งตาตก หรือมองไม่เห็นข้างใดข้างหนึ่ง
2. A (ARM/LEG) : แขนขาอ่อนแรง/ขา ชักใดซีกหนึ่ง หรือเดินเซ
3. S (SPEED) : พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ หรือฟังไม่เข้าใจ
4. T (TIME) : ต้องทราบเวลาที่เกิดอาการ และเวลาล่าสุดที่อาการปกติ

1. วัดสัญญาณชีพ
2. DTX Stat
3. O2 cannula 2-3 L/Min , keep O2 Sat > 95%

เป้าหมาย

1. ส่งโรงพยาบาลทันที
2. Golden period 3 ชม.
หลังมีอาการ เพื่อรับยาละลาย
ลิ่มเลือด Rt-PA

ส่งโรงพยาบาลทันที โทร.042-766105 หรือ 1669
(เตรียมใบส่งตัว ยาเติม และญาติสายตรง
ที่สามารถตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้)