




<b>แนวทางการรักษาและสั่งต่อ (Clinical Practice Guideline)</b>		
<b>เรื่องที่ 14 : แนวทางการรักษาและสั่งต่อผู้ป่วย Diarrhea</b>		
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการที่มนำ ทางคลินิก รพ.โคกศรีสุพรรณ	หน่วยงานที่ใช้ : รพสต.ในอำเภอโคกศรีสุพรรณ	ฉบับที่ 2 วันที่เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ตรวจสอบ  (นพ.ภาษิต พิพิธวณิชธรรม) นายแพทย์ปฏิบัติการ ประธานที่มนำทางคลินิก		ผู้อนุมัติ  (พญ.ณัฐภัทร์ นวัตกรรมศิริกุล) นายแพทย์ชำนาญการ วิชาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ

**บันทึกการประกาศใช้/ปรับปรุง**

ฉบับที่	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียด	แก้ไขโดย	อนุมัติโดย
1	1 เม.ย.61	-	พญ.ณัฐภัทร์	ผู้อำนวยการรพ.
2	1 ก.พ.64	-	นพ.ภาษิต	ผู้อำนวยการรพ.



# แนวทางการรักษาและส่งต่อผู้ป่วย

## Diarrhea สำหรับ รพสต.

ซักประวัติ : ท้องเสียถ่ายเหลว > 3 ครั้ง/วัน

ผู้ป่วยอายุ <15 ปี

มีอาการข้อใดข้อหนึ่ง (Warning sings)

- 1.อายุ < 1 เดือน
- 2.มีไข้สูง ปวดท้องรุนแรง อาเจียนรุนแรง
- 3.กดเจ็บท้องน้อยขวาชัดเจน
- 4.อ่อนเพลียมาก,กินไม่ได้,ตาโหล,มือเท้าเย็น,ชีพจรเร็ว

ไม่มี

วินิจฉัย : Acute Diarrhea

ให้การรักษาเบื้องต้น

- 1.ORS เด็กจิบ
- 2.Antiemesis drug
- 3.Simethicone
- 4.Buscopan

ผู้ป่วยอายุ >15 ปี

มีอาการข้อใดข้อหนึ่ง (Warning sings)

- 1.มีไข้สูง ปวดท้องรุนแรง อาเจียนรุนแรง
- 2.กดเจ็บท้องน้อยขวาชัดเจน
- 3.อ่อนเพลียมาก,ภาวะขาดน้ำมาก,กินไม่ได้

ไม่มี

วินิจฉัย : Acute Diarrhea

ให้การรักษาตามอาการ

- 1.ORS จิบ
- 2.Antiemesis drug
- 3.Simethicone
- 4.Buscopan
- 6.Norfloxacin(400) PO 1\*2 pc 3 day (กรณีถ่ายมีมูกเลือด + วินิจฉัย Infective Diarrhea)

มีอาการ

ส่งต่อโรงพยาบาล